Психическая структура

Итак, по своей психической структуре пациент несомненно старательный. Он хочет работать несмотря на серьезную болезнь, и этот факт сразу же исключает все “нестарательные” лекарства. Причиной болезни стала реакция организма на затянувшуюся скорбь вследствие смерти сына. Другими психическими характеристиками являются:

Скупость (Avarice).

Робость (Timidity).

Беспокойство о здоровье (Anxiety of health).

Физическая структура

Пациент потерял 10–12 кг веса, что, учитывая его начальный вес, может считаться истощением. У пациента крайняя слабость и упадок сил. Температурные модальности – зябкий, желание – теплая еда и освежающие напитки.

Слабость – от истощения (Weakness after emaciation).

Желания – сладости, освежающие напитки.

Зябкий.

Общая структура

Одной из важнейших характеристик, которую необходимо учесть в общей структуре, является скорость. Пациент медлительный, и болезнь также скрытая, медленно начавшаяся и медленно развивающаяся. Сфера действия, пораженный орган и патология очень важны, а поэтому лекарство, выбранное на основании психических и физических симптомов, должно также покрывать и их.

Скорость – медленный; постепенное развитие болезни.

Пораженный орган – сердце.

Патология – недостаток кровоснабжения, связанный со спазмом и атеросклерозом.

Миазм – *псоро-сикотический*.

Назначенным лекарством, соответствующим всему перечисленному выше, был *Acidum phosphoricum* 200. Пациент получил одну дозу.

Реперторизация

По д-ру Виджейкару, наиболее старательными лекарствами являются: Ars, Aur-met, Aur-ars, Aur-iod, Carc, Ign, Ferr-met, Ferr-ars, Ferr-iod, Lyc, Natr-ars, Natr-carb, Natr-sil, Sil, Staph, Iod, Ph-ac, M-arct, Thuj.

Дальнейшее наблюдение

Спустя 15 дней

Пациент, который ранее был очень слаб и не мог пройти нескольких метров без того, чтобы не начались боли за грудиной, начал проходить все большее и большее расстояние без болей. Потребность в таких лекарствах, как сорбитрат, которые он принимал 5–6 раз в день, значительно снизилась.

В дальнейшем улучшение продолжалось. Доза аллопатических лекарств была сначала снижена, а потом они были вовсе отменены. Стал проходить без болей около 2 км.

Спустя 6 месяцев

Может проходить около 2 км без появления загрудинных болей. Нервозность и тревожность значительно снизились. За это время в его семье было три случая серьезных болезней и смерти (сестра и другие близкие родственники), но со своим горем пациенту удалось справиться сравнительно легко.