ТИПЫ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

При оценке случая умственной отсталости следует сначала определить её тип и степень.

- **Легкая степень умственной отсталости** (IQ = 70−55)

Наиболее многочисленная группа. Пациенты обучаемы. По интеллектуальному уровню взрослые с такой степенью умственной отсталости соответствуют детям в возрасте от восьми до одиннадцати лет. У них нет никаких патологических изменений головного мозга или аномалий развития. Эта группа лучше всего поддается гомеопатической терапии, в целом она нуждается в психотерапии, социальной адаптации.

- **Умеренная степень умственной отсталости (**IQ = 55−40)

В этой группе возможна коррекция, но для этого требуется специализированная среда и определенная дисциплинированность ребенка. С такими детьми довольно тяжело, и родители быстро сдаются. Эти дети нуждаются в постоянной стимуляции. Без нее не будет никакого прогресса, несмотря на самое лучшее лечение. У них низкая скорость обучения. Они неуклюжие и неловкие. В целом они бывают негативно настроены и даже агрессивны, но чаще всего такое поведение является реакцией на окружающих, которые настроены к ним недружелюбно. Изначально они довольно приветливы, но интеллектуально ограничены. Взрослые с такой степенью умственной отсталости соответствуют детям в возрасте от четырех до семи лет. Рубрика: «Тело растет, а психика детская» – *Bufo* и *Bar*.

- **Тяжелая умственная отсталость (**IQ = 40−25).

Полностью зависимы от других людей (в отношении личной гигиены и самообслуживания). Двигательное и речевое развитие очень низкое. Есть нарушения чувствительности и двигательной активности. Такие дети находятся в интернатах для умственно отсталых. Для родителей, как правило, невозможны уход за ними и обучение.

- **Глубокая степень умственной отсталости (**IQ < 25).

Абсолютно зависят от поддержки окружающих. Очень низкие адаптационные способности, и чаще всего их жизнь очень коротка. Многие пациенты с синдромом Дауна умирают в раннем возрасте, редко доживая до 30−40 лет.

В этой группе весьма высок процент различных аномалий, в том числе генетических (*синдром Дауна, фенилкетонурия, кретинизм при недостаточности щитовидной железы, аномалии развития черепа: микроцефалия, макроцефалия, гидроцефалия*).

ВИДЫ АНОМАЛИЙ ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

☐ Кретинизм

Причины: болезни щитовидной железы, как следствие родовой травмы (кровоизлияние в зону щитовидной железы), как следствие кори, коклюша, дифтерии; недостаток йода в пище.

Лекарства при кретинизме: *Aeth., anac., bar-c., bufo, lap-a., thyr., absin., agn., alco., all-c., all-s., alum-p., alum-sil., amyg-a., anan., ang., arg-m., arn., aur-a., ayr–i., aur-sю, bac., bapt., bar-m., bar-s., brom., calcю, calc-p., calc-sil., cann-i., canth., carb-s., carc., centr., chin., chin-s., cic., der., hell., ign., iod., kali-bi., Kali-m., kali-sil., Kreos., lact., lil-t., lol., mang., nat-c., nat-i, nat-sil., nat-s., oxyt., ph-ac., plb., sars., sep., sol-n., strych., sulph., syph., tab., tanac., tax., tub.* (из неопубликованных работ д-ра Таркаса и д-ра Кулкарни)

Thyreoidinum – лекарство выбора при недостаточности щитовидной железы и кретинизме. Если мать в течение беременности принимала препараты щитовидной железы, то вполне вероятно, что ей и ее ребенку после родов потребуется *Thyr.*

Следует различать кретинизм как стадию умственной отсталости и как заболевание при недостаточности щитовидной железы. Это два совершенно разных состояния, хотя название одно.

☐ Гидроцефалия

Причины: опухоль головного мозга, субдуральная гематома, менингит и др. Клиническая картина гидроцефалии обусловлена распространенностью повреждения нервной ткани, которая зависит в свою очередь от возраста, в котором это случилось, от продолжительности и тяжести повреждения.

Травма, приведшая к гидроцефалии: *Acon., Arn., Bell., Hell., Hyper., Nat-s., Sil.*

Одно из лучших лекарств при гидроцефалии вследствие травмы *Nat-s.*

У меня есть очень интересный случай ребенка, у которого после введения менингококковой вакцины развилось бессознательное состояние, и была выявлена опухоль головного мозга. Этот случай очень похож на случай с женщиной, который я вам сегодня показывал. Ему отказали в операции и химиотерапии ввиду неоперабельности опухоли из-за больших ее размеров и

предрекли смерть через восемь месяцев, но он живет до сих пор благодаря гомеопатии.

Гидроцефалия – большая рубрика, она есть в Репертории.

В случае гидроцефалии не забывайте о *Chininum sulphuricum*!

Любой ион серы (в виде аниона или катиона) обладает очень глубоким действием.

☐ **Синдром Дауна**: *Bar-c., Bar-m., Bufo, Calc-p., Carb-s., Carc., Con,. Hyos., Med., Phos., Pituin., Syph., Thyr., Tub., Sil.*

У меня есть пациент с синдромом Дауна, который уже в течение 1,5 лет прекрасно идет на *Sil*, слегка отставая от своих сверстников. Здесь необходимо именно конституциональное назначение.

☐ **Аутизм**

Для аутизма в целом характерно нарушение взаимодействия с окружающим миром и эмоциональная неадекватность. У них нарушена способность пользоваться языком, как вербальным, так и не вербальным. Общение предполагает главным образом вербальное взаимодействие, зрительный контакт, которые у них нарушены.

В возрасте трех-четырех лет у ребенка на фоне вроде бы нормального развития, вдруг без каких-либо причин наступает регресс с эмоциональным уходом в собственный мир вследствие эмоциональной или физической травмы. Эти дети не могут правильно взаимодействовать с окружением и будто являются заложниками своего эмоционального мира, не могут выйти за его пределы.

Их организм не способен сопротивляться действию токсинов вакцин и тяжелых металлов. Они не желают вырастать, отмечается регресс на всех уровнях при нормальном первоначальном развитии. Три основных металла, играющих основную роль в развитии аутизма: медь, свинец, ртуть.

Причины аутизма:

○ Инфицирование дрожжевыми грибами. Различные глютенсодержащие вещества участвуют в патогенезе аутизма. часто отказ от глютенсодержащих веществ приводит к улучшению состояния аутичных детей;

○ недостаток фермента, участвующего в передаче нервного импульса, травмы головного мозга;

○ тяжелое миазматическое влияние у детей (как конституциональная слабость);

○ недостаток активизирующих влияний ретикулярной формации на кору головного мозга;

○ структурные изменения в мозжечке.

Металлотионеин – белок организма, выполняющий в организме жизненно важные функции (он построен из 60−70 аминокислот и 7 атомов цинка). В кишечнике он выступает в качестве связующего агента тяжелых металлов за счет присутствия цинка в его молекуле, котторый обменивается на ртуть, свинец, платину, алюминий и другие ионы тяжелых металлов. Металлотионеин таким образом устраняет воздействие тяжелых металлов, а его недостаток в организме (развивающийся в том числе при вакцинации), способствует развитию аутизма.

Хроническое воздействие ртути (как консерванта вакцин) при интенсивных прививках в раннем возрасте, комбинированное действие множественных вакцин (которые часто вводятся в виде одной прививки) подрывают иммунную систему ребенка, являясь нередко запускающими факторами развития аутизма.

Во всем мире количество детей с аутизмом увеличивается, и гомеопатия играет важную роль в лечении этой патологии.

Рекомендации по образу жизни при аутизме

✓ Лечение аутизма направлено в первую очередь на *снижение воздействия солей тяжелых металлов* (удаление амальгамных пломб, избегание вакцинаций во время беременности или в раннем детстве). Медь, свинец, ртуть – основные металлы в формировании аутизма. Уменьшение контактов с металлами (неметаллическая кровать).

✓ Желательно *пить только чистую воду*. Часто в бассейнах и различных водоемах может содержаться сульфат меди, и тогда следует избегать купания в таких местах.

✓ Необходимо *исключение пищи с повышенным содержанием меди*: шоколада, крабов, морепродуктов, пищевых добавок. Должно быть гармонизировано поступление в организм пищевых веществ, чтобы не увеличивалось содержание солей тяжелых металлов. *Диета безглютеновая и безмолочная* (безказеиновая), содержащая кальций, магний, аминокислоты.

✓ Использование биотина и витаминов группы В, антиоксидантов, витаминов С, Е антиоксидантов, магния, селена для *стимуляции выработки металлотионеина*.

✓ *Детоксикация вакцин. Thuja* должна назначаться очень многим пациентам с аутизмом. При отравлениях ртутью показан *Merc*.

✓ *Избегание терапии антибиотиками*, ухудшающими кишечную флору. При инфекции использование натуропатических средств.

Рубрики, используемые при аутизме:

- Оцепенелый (*Dazed*)
- Погруженность в себя (*Absorbed*)
- В мечтах (*As if in a dream*)
- Поведение, дурашливое (*Behaviour, foolish*)
- Поведение, кричит (*Behaviour, shrieking*)
- В мечтах, сутками (*As if in a dream, day time*)
- Поведение, кричит (ребенок) (*Behaviour, shrieking in children*)
- Поведение, швыряет вещи (*Behaviour, throws things at people*)
- Грубый, резкий (*Abrupt, Rough*)
- Раздражительный (*Irritability*)

Раздражительный, все видит с плохой стороны (*Bad part takes everything in*)

- Склонный спорить (*Discuss desire to*)
- Недружелюбный (*Unamiable, Unfriendly*)
- Медлительность (*Slowness*)